

# atvērtā kopa 2014

Komandu olimpiāde matemātikā

## 10. klases uzdevumi un atrisinājumi

1. Skolā, kurā mācās skolēni no 1. līdz 12. klasei, optimālais paralēlklašu skaits katrā no klašu grupām ir 3 un optimālais skolēnu skaits katrā klasē ir no 20 līdz 25. Kāds ir optimālais skolu skaits Valmierā, lai visiem bērniem būtu kur mācīties, ja tajā dzīvo 25'000 iedzīvotāju un 16% no tiem ir vecumā no 7 līdz 19 gadiem? Izskaidrojiet savus papildu pieņēmumus!

### Atrisinājums:

Pieņemsim, ka visi bērni vecumā 7-19 iet skolā, turklāt visās klašu grupās aptuveni vienādi daudz. Tātad Valmierā ir  $25'000 \cdot 0.16 = 4'000$  skolēnu, katrā klašu grupā aptuveni  $4'000/12 \approx 333$ . Attiecīgi, katrā klašu grupā paralēlklasē ar burtu A mācīsies aptuveni 111 skolēni. Tā kā  $111/25 > 4$ , vajadzēs vismaz piecas skolas. Redzam, ka ar piecām skolām pietiktu, jo tad A klasēs katrā klašu grupā varētu mācīties 100 līdz 125 skolēni, un 111 skolēniem tas būs optimāli.

2. Matemātiķiem, gatavojot olimpiādi, bija jāizdomā 36 uzdevumi. Viņi izdomāja par vienu uzdevumu dienā mazāk nekā sākotnēji plānots, tādējādi iekavējot noteikto termiņu par 6 dienām. Cik dienas viņi sākotnēji bija plānojuši strādāt?

### Atrisinājums:

Sastādām un atrisinām vienādojumu ar mainīgo  $k$ , kas apzīmē plānoto uzdevumu skaitu dienā.

$$\begin{aligned}36/k + 6 &= 36/(k - 1) \\36(k - 1) + 6k(k - 1) &= 36k \\6k^2 - 6k - 36 &= 0 \\k^2 - k - 6 &= 0 \\k &\in \{-2, 3\}.\end{aligned}$$

Tā kā negatīvs uzdevumu skaits neder, bija plānots izdomāt 3 uzdevumus dienā. Attiecīgi atbilde ir, ka bija plānots strādāt  $36/3 = 12$  dienas. Varam pārbaudīt, ka slinkuma dēļ beigās sanāca strādāt  $36/2 = 18$  dienas, par 6 vairāk nekā plānots.

3. Saeimas vēlēšanās Rīgas vēlēšanu apgabalā ievēlami 29 deputāti. Piecu procentu barjeru pārvarējušās partijas ieguva šādus balsu skaitus: SC 64971; PCTVL 27308; ZZS 25851; LPP/LC 22223; TP 35813; JL 46813; TB/LLNK 21488. Aprēķiniet, cik mandātus Rīgas apgabalā ieguva katra partija, atbilstoši vēlēšanu likuma 38. pantam.

*Vēlēšanu likuma 38. pants atrodams pielikumā.*

### Atrisinājums:

Sekojošā vēlēšanu likuma 38. panta instrukcijām, dalām iegūtos balsu skaitus katrai partijai ar nepāra skaitļiem 1, 3, 5 utt. Iegūtie daļījumi (noapaļoti) ir tabulā zemāk. Iekrāsojam treknā druknā lielākos daļījumus, līdz esam iekrāsojuši kopumā 29 skaitļus. Mazākais no tiem ir 4298. Visi neiekrašotie skaitļi ir mazāki. Izskaitām treknos skaitļus, lai iegūtu atbilstošos mandātu skaitus; rezultāti ir tabulas pēdējā kolonnā.

	1	3	5	7	9	11	13	15	17	
SC	<b>64971</b>	<b>21657</b>	<b>12994</b>	<b>9282</b>	<b>7219</b>	<b>5906</b>	<b>4998</b>	<b>4331</b>	3822	8
PCTVL	<b>27308</b>	<b>9103</b>	<b>5462</b>	3901	3034	2483	2101	1821	1606	3
ZZS	<b>25851</b>	<b>8617</b>	<b>5170</b>	3693	2872	2350	1989	1723	1521	3
LPP/LC	<b>22223</b>	<b>7408</b>	<b>4445</b>	3175	2469	2020	1709	1482	1307	3
TP	<b>35813</b>	<b>11938</b>	<b>7163</b>	<b>5116</b>	3979	3256	2755	2388	2107	4
JL	<b>46813</b>	<b>15604</b>	<b>9363</b>	<b>6688</b>	<b>5201</b>	4256	3601	3121	2754	5
TB/LLNK	<b>21488</b>	<b>7163</b>	<b>4298</b>	3070	2388	1953	1653	1433	1264	3

Piebilde. Šie skaitļi atbilst 9. Saeimas vēlēšanām.

4. Septiņi rūķīši reģistrējās Tviterī un daži sāka sekot citiem (tikai savā starpā). Pāris ( $a, b$ ) apzīmē kāda rūķīša sekotāju skaitu  $a$  un izsekoto skaitu  $b$ . Vai var gadīties, ka vienlaicīgi septiņiem rūķīšiem šie pāri ir

a) (1,6), (2,6), (2,2), (3,1), (3,0), (3,2), (3,0) ?

b) (5,5), (2,1), (0,4), (3,3), (2,6), (4,2), (6,1) ?

**Atrisinājums:**

a) Jā, ir iespējams, piemēram, kā attēlots tabulā (ar + atzīmēts, kurš rūķītis seko kuram):

		kam							
		1	2	3	4	5	6	7	cik
kas	1		+	+	+	+	+	+	6
	2	+		+	+	+	+	+	6
	3		+		+				2
	4						+		1
	5								0
	6					+		+	2
	7								0
cik		1	2	2	3	3	3	3	17

b) Nē, nevar gadīties, ka piektais rūķītis seko visiem sešiem pārējiem, taču trešajam nav sekotāju.

5. Friziere augustā piedāvāja matu griezumam par īpašu cenu (8.23€), jo "2014. gada augusts ir vienīgais tavā dzīvē, kurā būs 5 piektdienas, 5 sestdienas un 5 svētdienas! Pēdējo reizi tas bija 1191. gadā, nākamreiz būs 2837. gadā; reizi 823 gados šis fenomens!" Vai (un kāpēc) viņai ir taisnība? Ja nē, izskaidro, cik bieži patiesībā notiek šāds fenomens!

**Atrisinājums:**

Tas gadās tieši tajos gados, kad 1. augusts ir piektdiena. Parastā gadā ir 365 dienas, tātad 52 nedēļas un 1 diena. Nākamgad ir parasts gads, un 1. augusts būs sestdiena un tā katru gadu pa vienai dienai klāt. Garajā gadā ir 366 dienas, tātad tajā 1. augusts būs par divām nedēļas dienām vēlāk nekā iepriekšējā. Katrs ceturtais gads ir garais (izņemot, ja gadskaitlis dalās ar 100, bet ne 400 - bet šo gadījumu ignorēsim). Nākamais garais gads ir 2016. Tātad, sākot ar 2014. gadu, 1. augusts iekritīs šādās dienās:

...	...	2014	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	'26	'27
...	...	<b>Pk</b>	Se	Pr	Ot	Tr	Ce	Se	Sv	Pr	Ot	Ce	<b>Pk</b>	Se	Sv
2028	'29	'30	'31	'32	'33	'34	'35	'36	'37	'38	'39	'40	'41	'42	...
Ot	Tr	Ce	<b>Pk</b>	Sv	Pr	Ot	Tr	<b>Pk</b>	Se	Sv	Pr	Tr	Ce	<b>Pk</b>	...

(garie gadi *kursīvā*, piektdienas **treknā drukā**). 2042. gada 1. augusts atkal ir piektdienā, turklāt pēc diviem gadiem seko garais gads, tātad identisks 28 gadu cikls sākas no jauna. Redzam, ka "fenomens" atkārtojas ritmā ik pa 11-6-5-6 gadiem, un mūsu dzīvē būs vēl daudz šādu augustu.

6. *Capital One (CO)* akcijas pirms gada maksāja 30\$. Biržā par 3.25\$ varēja nopirkt loterijas biļeti (t.s. *opciju*), kas pēc gada izmaksātu laimestu  $x - 40$  gadījumā, ja *CO* akcijas tajā brīdī maksā  $x$  dolārus, un  $x$  ir vairāk nekā 40\$. *Cornwall Capital Management* par 26'000\$ iegādājās daudz šādu opciju un pēc gada saņēma laimestu 480'000\$. Cik tajā brīdī maksāja *CO* akcijas?

**Atrisinājums:**

*CCM* nopirka  $26'000/3.25=8'000$  opcijas. Tātad laimests katrai opcijai bija  $480'000/8'000=60$ \$. Tātad *CO* akciju vērtība bija pieaugusi līdz  $40+60=100$  dolāriem.

7. Edgars ar Olgu bija sešu dienu ilgā velobraucienā Toskānā. Pirmajā dienā viņi nobrauca par 3km vairāk nekā otrajā. Trešajā dienā - divreiz vairāk nekā ceturtajā, taču vidēji tikpat, cik pirmajā. Pirmajā un piektajā dienā kopā sanāca 100km - tikpat, cik saskaitot trešajā un sestajā dienā nobraukto. Cik kilometrus viņi nobrauca katrā no dienām, ja kopumā odometrs rādīja 277km?

**Atrisinājums:**

Apzīmējam 1.-6. dienā nobrauktos km ar  $a, b, c, d, e, f$  un sastādām vienādojumu sistēmu:

$$\begin{cases} a = b + 3 \\ c = 2d \\ c + d = 2a \\ a + e = 100 \\ c + f = 100 \\ a + b + c + d + e + f = 277 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = a - 3 \\ c = 2d \\ 3d = 2a \\ e = 100 - a \\ f = 100 - 2d \\ a + a - 3 + 2d + d + 100 - a + 100 - 2d = 277 \end{cases}$$

Nemam trešo rindu un vienkāršojam pēdējo, lai atrastu  $a$  un  $d$ , un no tiem - pārējos mainīgos:

$$\begin{cases} 3d = 2a \\ a + d = 80 \end{cases} \Rightarrow 3(80 - a) = 2a \Rightarrow a = 48, b = 45, c = 64, d = 32, e = 52, f = 36.$$

Šie arī attiecīgi ir nobrauktie attālumi katrā no dienām.

8. Kāds ir lielākais punktu skaits FIFA futbola Pasaules kausa finālturnīra grupu posmā, ar kādu komanda var nekvalificēties izslēgšanas spēļu kārtai? Kāds ir mazākais punktu skaits, ar kuru komanda var kvalificēties?

*Informācija par turnīra norisi atrodama pielikumā.*

**Atrisinājums:**

*Lielākais punktu skaits, ar kuru var nekvalificēties izslēgšanas spēļu kārtai.* Apskatīsim, kāpēc 7 punkti nav atbilde šim jautājumam. Grupu posmā katras grupas ietvaros tiek izspēlētas 6 spēles. Maksimālais punktu skaits, ko var iegūt katrā spēlē ir 3, tātad kopā - 18. Lai komanda nekvalificētos, tai grupā jāpaliek 3. vai 4. vietā. Ja komandai 3. vai 4. vietā ir 7 punkti, tad komandām pirmajās divās vietās arī ir jābūt vismaz 7 punktiem. Tātad šīm trim komandām kopā ir jābūt vismaz 21 punktam. Taču kopā maksimālais punktu skaits, ko var nopelnīt, ir 18. Iegūstam pretrunu, kas nozīmē, ka lielākais punktu skaits, ar kuru var nekvalificēties izslēgšanas spēļu kārtai, ir mazāks nekā 7.

Apskatīsim grupu, kurā komanda nekvalificējas nākamajam posmam, lai gan ir ieguvusi 6 punktus. Grupā ir komandas A, B, C un D. Spēļu rezultāti ir sekojoši:

A : B (1 : 0)

A : C (0 : 1)

A : D (3 : 0)

B : C (1 : 0)

B : D (2 : 0)

C : D (1 : 0)

Tabulā redzams, ka komanda C ar 6 punktiem nekvalificējas nākamajam posmam.

Komanda	Vārtu starpība	Punkti
A	+3	6
B	+2	6
C	+1	6
D	-6	0

Mazākais punktu skaits, ar kuru komanda var kvalificēties. Ar 1 punktu grupu turnīrā komandai nav iespējams kvalificēties nākamajam posmam. Katra komanda izspēlē 3 spēles. Ja komanda ir saņēmusi tikai 1 punktu, tas nozīmē, ka tā 2 spēlēs ir zaudējusi, tātad ir vismaz 2 komandas ar vismaz 3 punktiem.

Komanda var kvalificēties nākamajam posmam ar 2 punktiem. Piemēram, šādā gadījumā, kad kvalificējas komanda B ar 2 punktiem:

A : B (1 : 0)  
A : C (2 : 0)  
A : D (3 : 0)  
B : C (0 : 0)  
B : D (0 : 0)  
C : D (0 : 0)

Komanda	Vārtu starpība	Punkti
A	+6	9
B	-1	2
C	-2	2
D	-3	2

9. Pierādīt, ka jebkuriem naturāliem skaitļiem  $n$  un  $k$  iespējams pakāpi  $n^k$  izteikt kā  $n$  pēc kārtas ņemtu nepāra skaitļu summu.

**Atrisinājums:**

$n$  pēc kārtas ņemti nepāra skaitļi veido aritmētisko progresiju  $a, a + 2, a + 4, \dots, a + 2(n - 1)$ , kuras summu aprēķina pēc formulas  $(a + a + 2(n - 1))n/2$ . Lai atrastu  $a$ , risinām vienādojumu

$$n^k = (a + a + 2(n - 1))n/2$$

$$n^{k-1} = a + n - 1$$


$$a = n^{k-1} - n + 1.$$

Atliek pārbaudīt, vai  $a$  ir nepāra. Ja  $k - 1 \geq 1$ , tad  $n^{k-1}$  un  $n$  paritāte sakrīt, līdz ar to starpība ir pāra skaitlis. Pieskaitot 1, iegūstam nepāra skaitli  $a$ . Ja  $k - 1 = 0$ , t.i.  $k = 1$ , tad  $n^{k-1} = n^0 = 1$ . Ja  $n$  ir nepāra, tad pamatojam kā iepriekš. Ja  $n$  ir pāra, tad iegūstam, ka atrisinājums ir  $a = 1 - n + 1$ , pāra skaitlis.

Tātad pakāpi  $n^k$  iespējams izteikt kā  $n$  pēc kārtas ņemtu nepāra skaitļu summu tad, ja  $k > 1$  vai arī, ja  $k = 1$  un  $n$  ir nepāra. Atlikušajā gadījumā ( $k = 1, n$  pāra) tas nav iespējams.

10. BMX velosipēda priekšējam zobratam ir 44 zobi, aizmugurējam 16. Attālums starp zobratu asīm (centriem) ir 13 collas. Ķēdei katrs posms ir  $1/2$  collu garš. Cik posmu garu ķēdi vajag, lai tā būtu precīzi nospriegota? *Padoms:*  $\cos(80^\circ) = 0.174, \sin(80^\circ) = 0.985$ .

**Atrisinājums:**



Katrs zobš atbilst vienam ķēdes posmam, tātad zobratu apkārtmēri ir attiecīgi 22" un 8", un to rādiusi  $R = 11/\pi$  un  $r = 4/\pi$ .  $ED$  ir pieskare abām riņķa līnijām, tādēļ rādiusi  $AE$  un  $DC$  ir tai perpendikulāri. Novelkam  $AB$  paralēlu  $ED$ , iegūstot taisnstūri  $ABDE$ .  $\triangle ABC$  ir taisnleņķa, ar hipotenūzu  $AC$  garumā 13". Katete  $BC$  ir garumā  $R - r = 7/\pi \approx 2.23$ . Sauksim  $\angle ACB$  par  $\alpha$ . Tad  $\cos(\alpha) = BC/AC \approx 0.17$ , un no *padoma* secinām, ka  $\alpha \approx 80^\circ$ . Seko, ka  $ED = AB = AC \cdot \sin(\alpha) \approx 12.8$ . Atliek izrēķināt ķēdes ārējo loku garumus. Tā kā to leņķiskie izmēri ir  $200^\circ$  un  $160^\circ$ , iegūstam  $22 \cdot 200^\circ/360^\circ = 12.2$  un  $8 \cdot 200^\circ/360^\circ = 3.6$ . Tātad ķēdes kopējais garums ir vismaz  $2 \cdot 12.8 + 12.2 + 3.6 = 41.4$  collas. Tā kā katra posma garums ir 0.5 collas, vajadzēs 83 posmus.

11. Pierādīt, ka vienādojumam  $4x^2 - 5y^2 = 12$  nav atrisinājuma, kur  $x$  un  $y$  ir veseli skaitļi.

*Padoms:* apskatīt atlikumu, dalot ar 5.

**Atrisinājums:**

12 dalot ar 5, atlikums ir 2. Tādam pašam jābūt kreisajā vienādojuma pusē. Tā kā  $5y^2$  dalās ar 5, apskatām iespējamos  $4x^2$  atlikumus. Ja  $x$  atlikums ir 0,1,2,3 vai 4, tad  $4x^2$  atlikums ir attiecīgi 0, 4, 1, 1, 4. Tātad nav iespējams, ka kreisajā pusē atlikums dalot ar 5 ir 2, līdz ar to neeksistē atrisinājums veselos skaitļos.

12. Cik ir tādu četrциparu skaitļu, kuru pierakstā ir izmantoti tieši 2 dažādi cipari?

**Atrisinājums:**

Pieņemsim, ka meklētais četrциparu skaitlis sastāv no cipariem  $a$  un  $b$ , kur  $a$  ir pirmais cipars četrциparu skaitlī. Ciparu  $a$  mēs varam izvēlēties 9 variantos (1-9), savukārt  $b$  varēsim izvēlēties 9 variantos (visi 10 cipari, izņemot jau 1. pozīcijā izvēlēto). Tātad  $9 \cdot 9 = 81$  varianti. Apskatīsim, cik variantos varēsim izveidot četrциparu skaitli no izvēlētajiem cipariem  $a$  un  $b$ . Pirmajā pozīcijā varēs būt tikai  $a$ , savukārt nākamajās trijās pozīcijās  $a$  vai  $b$  - kopā  $2 \cdot 2 \cdot 2$  varianti. Jāņem vērā, ka šie varianti iekļauj arī skaitli  $aaaa$ , kurš neatbilst nosacījumiem. Tātad četrциparu skaitli no diviem dažādiem cipariem varam izveidot  $9 \cdot 9 \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2 - 1) = 567$  veidos.

13. Martinam Gārdneram oktobrī atzīmēja 100. gadadienu.  $1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = 100 = (1+2+3+4)^2$ . Vai vienādība  $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2$  ir patiesa visiem naturāliem  $n$ ?

**Atrisinājums:**

Atrisinājumam izmantosim matemātiskās indukcijas principu. Ar  $A(k)$  apzīmēsim vienādību

$$1^3 + 2^3 + \dots + k^3 = (1 + 2 + \dots + k)^2.$$

*Indukcijas bāze.*  $A(1)$  ir patiess, jo  $1^3 = 1 = 1^2$ .

*Induktīvā pāreja.* Pārlicināsimies, ka  $A(k+1)$  ir patiess, ja  $A(k)$  ir patiess.

Risinājumā izmantosim vienādību  $1 + 2 + \dots + n = n(n+1)/2$ .

$$\begin{aligned} (1 + 2 + \dots + k + (k+1))^2 &= ((1 + 2 + \dots + k) + (k+1))^2 = \\ &= (1 + 2 + \dots + k)^2 + 2(1 + 2 + \dots + k)(k+1) + (k+1)^2 = \\ &= (1 + 2 + \dots + k)^2 + 2 \cdot \frac{k(k+1)}{2} \cdot (k+1) + (k+1)^2 = \\ &= (1 + 2 + \dots + k)^2 + k(k+1)^2 + (k+1)^2 = \\ &= (1 + 2 + \dots + k)^2 + (k+1)^3 = \\ &= 1^3 + 2^3 + \dots + k^3 + (k+1)^3, \text{ k.b.j.} \end{aligned}$$

14. Grīns un Tao pierādīja, ka jebkuram naturālam  $n$  eksistē aritmētiska progresija garumā  $n$ , kura sastāv tikai no pirmskaitļiem. Pierādīt, ka neeksistē bezgalīgi gara šāda aritmētiska progresija.

**Atrisinājums:**

Ja aritmētiskās progresijas pirmais loceklis ir  $a_1 = p$  un solis ir  $d$ , tad  $k$ -to locekli iegūst pēc formulas  $a_k = p + d(k - 1)$ . Ja apskatām  $p + 1$ -mo locekli, iegūstam  $a_{p+1} = p + d(p + 1 - 1) = (d + 1)p$ , tātad tas nevar būt pirmskaitlis (jo tas dalās ar pirmskaitli  $p$  un ar  $d + 1 > 1$ ). Tādēļ šis pirmskaitļu aritmētiskās progresijas garums nevar būt lielāks par  $p$ . Šis uzdevums parāda, ka matemātikā jēdzieniem “neierobežoti garš” un “bezgalīgs” ir būtiski atšķirīgas nozīmes.

15. Pieci draugi lido uz Maroku ar lidmašīnu, kurā ir 16 rindas un katrā rindā ir 5 sēdvietas, turklāt visas no tām ir aizpildītas. Tā kā viņi lido ar lidsabiedrību Rajaneir, viņi nevar izvēlēties, kur sēdēt, tādēļ viņu sēdvietas ir patvaļīgi izkaisītas pa lidmašīnu. Katrs no draugiem var vairākkārt sarunāt apmainīties vietām ar pa kreisi, pa labi, priekšā vai aizmugurē sēdošo pasažieri (ja starp divām sēdvietām ir lidmašīnas eja, tad uzskatām, ka tās atrodas blakus). Kāds ir mazākais pārsēšanos skaits, pie kura vienmēr, neatkarīgi no sākotnējā draugu sēdvietu sadalījuma pa lidmašīnu, kādi divi no viņiem spēs apsēsties viens otram blakus?

**Atrisinājums:**

Lidmašīnas sēdvietu plānu varam uzskatīt par  $16 \times 5$  rūtiņu tīklu. Šo tīklu varam sadalīt 4 vienādos taisnstūros ar izmēriem  $4 \times 5$ . Tad, zinot, ka lidmašīnā lido 5 draugi, būs skaidrs - kādā no taisnstūriem būs apsēdušies vismaz 2 draugi. Tādēļ pārsēšanos skaits, kas būs nepieciešams, lai no šī taisnstūra kādi 2 draugi nonāktu viens otram blakus, būs ne vairāk kā 6 pārsēšanās: (taisnstūra platums - 1) + (taisnstūra augstums - 1) - 1 = 3 + 4 - 1 = 6. Attiecīgi mazākais pārsēšanos skaits, lai 2 kādi draugi sēdētu blakus, nevarēs būt lielāks par 6. Atliek uzrādīt situāciju, kurā nepieciešamas vismaz 6 pārsēšanās - skat. shematisku attēlojumu zemāk.

			X								X				
X								X							X

**X - draugu sēdvietas**